

**AWAS:**

a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci tangan dan alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogel, penutup muka dan alat pernafasan (respirator) supaya tidak terhadu kabus semburan.

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik, ikan dan lebah. Jangan cemarkan kolam, sungai atau saliran air dan jangan sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

**TANDA KERACUNAN:** Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit. Pendedahan yang berlebihan menyebabkan hilang kawalan gerakan dan gaya berjalan yang tidak stabil.

**RAWATAN KECEMASAN:** Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

**RAWATAN PERUBATAN:** Jika tertelan, lakukan kurasan gaster dengan berhati-hati untuk mencegah penyedutan. Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

**MEDICAL TREATMENT:** If swallowed, perform gastric lavage with care to prevent aspiration. Treatment is symptomatic.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.**

**POISONOUS  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN**

# MYPHOS 505

PEKATAN TEREMULSI (EC)



Ulat Pengorek Buah  
蛀果虫 (5X)



Koya 粉介壳虫 (3X)

RACUN  
SERANGGA  
殺虫劑  
INSECTICIDE



Kepinding Nyamuk 可可青蚊 (4X)

Perawis Aktif : chlorpyrifos ..... 45.9% w/w  
cypermethrin ..... 4.6% w/w  
Perawis Lengai : ..... 49.5% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/8089

Kandungan Bersih: 1 liter

Tarikh Mengilang:

#### BACA LABEL SEBELUM GUNA

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)  
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

Didaftarkan oleh:

**Mycrop Sdn. Bhd.** 国农有限公司 (507146-W)  
36, Laluan Perindustrian Silibin 2, Off Jalan Jelapang,  
30020 Ipoh, Perak. Tel: 05-528 5281 Faks: 05-528 4281



#### ATURAN PENGGUNAAN 推荐使用法：

**MYPHOS 505** ialah racun serangga campuran yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut daripada kumpulan organophosphorus dan pyrethroid.

**MYPHOS 505** 是混合了兩種活性成份的接觸性及胃毒性殺蟲劑。

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Tanaman 作物	Serangga Perosak 害虫	Kadar Racun 用藥量		Isi Padu Semburan Sehektar 每公頃噴液量
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar ml/毫升	
Koko 可可	Ulat Pengorek Buah 蛀果虫 ( <i>Conopomorpha cramerella</i> )	5 ml/毫升	75 ml/毫升	150 liter/公升
	Koya 粉介壳虫 ( <i>Pseudococcus sp.</i> )	10 ml/毫升	150 ml/毫升	
	Kepinding Nyamuk 可可青蚊 ( <i>Helopeltis theobromae</i> )	24 ml/毫升	360 ml/毫升	

Jangan kutip hasil tanaman koko sekurang-kurangnya 14 hari selepas semburan terakhir.  
在最后一次噴藥後，最少 14 天內不可採收可可。

#### Panduan Membancuh

Disyorkan menggunakan alat penyembur galas bernozel "solid cone". Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **MYPHOS 505** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan.

#### Panduan Menyembur

Lakukan semburan apabila serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke atas daun. Ulangi semburan selang **14-21 hari** sekali apabila serangan masih berkekalan. **JANGAN** guna racun ini lebih dari **2 kali** semburan semusim. Untuk mengurangkan kesan ke atas semut hitam, cuba sembur pada sasaran sahaja dan jangan sembur terus kepada sarang semut hitam. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan **MYPHOS 505** berselang-seli dengan racun serangga lain yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI) : 24 jam.

**BERACUN  
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN  
DAN KANAK-KANAK**

**KELAS II**

**有毒品  
勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方**

**ஈர்வுகள் மற்றும் குழந்தை  
தலைக்கு அருகில் வைக்காதீர்**